


Моя первая книжка. Все упражнения и тексты придуманы мной. Очень эффективны и просты в применении. Дети с удовольствием их выполняют и заучивают движения вместе с художественным словом. При Вашем желании приобрести такую книжку, можно обратиться лично.



Консультация для родителей

ПЕРВИЧНОЕ ЗАИКАНИЕ. ЧТО ДЕЛАТЬ?

В первый период заикания ребёнка, особенно в первые 10 дней, проводится следующая терапия: ребенок снимается с посещения детского сада, любых мероприятий, не рекомендуется даже гулять, чтобы не спровоцировать всплеск эмоций! Дома, нельзя включать громкую, динамичную музыку, не включается ТВ. Ребенку запрещают говорить вообще и сами взрослые переходят на шепотную, медленную речь, только по самым веским причинам. Ребенку даются седативные препараты: Глицин, Валерьяна или Пустырник (по назначению врача), небольшие дозы Мидокалма, чтобы снять патологический мышечный спазм или назначается Магний В6. Ребенку объясняется, что он приболел и надо чаще спать, чтобы поправиться. Так проходят 10-ть дней. За это время, импульс, порождающий заикание в коре головного мозга теряет свою силу и либо сходит "на нет", либо сильно притормаживается, что сказывается на благоприятном прогнозе лечения логоневроза. Взрослые не должны в присутствии ребенка никогда повышать голос, должны говорить медленной, плавной речью, убрать чрезмерные эмоции. Учить говорить ребенка на выдохе, как бы протягивая слова, то есть напевно. Воздух набирать в нижнюю часть живота, следить, чтобы при вдохе не поднимались плечи (это неправильный вдох).

Не давать ребенку шоколад, конфеты, какао, пока речь не стабилизируется.